

Parassikil

2,10 g Collare antiparassitario per gatti

58L



Collare antiparassitario
per GATTI

Parassikil

2,10 g Collare antiparassitario per gatti
Diazinone




A104796014



Parassikil
2,10 g Collare antiparassitario
per gatti

8 033638 272602



SOLO PER USO VETERINARIO. La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta a ricetta medico-veterinaria. **TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI**
NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: VIRBAC, 1ère Avenue - 20651M - LID - 06516 Carros - Francia
Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti: ALFAMED - 13ème rue - LID - 06510 Carros - Francia
Distributore in Italia: Formevet S.r.l. - Via Savona, 97 - 20144 Milano - Italia

A/1117

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE - Un collare da 14 g (35 cm) contiene: principio attivo: diazinone 2,10 g. **INDICAZIONI** - Trattamento delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides felis*) nel gatto per un periodo di 8 mesi. **POSOLOGIA, MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE** - Uso esterno. Deve essere applicato intorno al collo un collare per animale. Togliere il collare dal sacchetto e regolarlo attorno al collo dell'animale avendo cura di lasciare uno spazio di 2-3 dita tra il collo dell'animale ed il collare. Tagliare la parte in eccedenza. Il collare non teme l'umidità e le sue proprietà non vengono alterate anche se bagnato. La sua attività si protrae per un periodo di 8 mesi. **CONTROINDICAZIONI** - Non utilizzare su animali malati o convalescenti o su animali con estese lesioni della pelle. Non utilizzare su gattini di meno di 3 mesi. Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti. **REAZIONI AVVERSE** - Una leggera e transitoria reazione (locale perdita di pelo, eritema, prurito, croste) può comparire sul collo dell'animale nel punto d'applicazione, si raccomanda una temporanea rimozione del collare fino alla scomparsa dei sintomi. In rarissimi casi, tremori, atassia, così come letargia, anoressia e ipersalivazione possono essere osservati. La frequenza delle possibili reazioni avverse è definita utilizzando la seguente convenzione: molto comune (interessa più di 1 animale su 10), comune (interessa da 1 a 10 animali su 100), non comune (interessa da 1 a 10 animali su 1.000), raro (interessa da 1 a 10 animali su 10.000), molto raro (interessa meno di 1 animale su 10.000), non noto (non è possibile stimare la frequenza in base ai dati disponibili). Se dovessero manifestarsi effetti collaterali anche quelli non menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario. **AVVERTENZE SPECIALI** - In caso di irritazione cutanea, togliere immediatamente il collare. Generalmente, le zecche verranno uccise e cadranno dall'ospite entro 48 ore dall'infestazione. **Precauzioni speciali per l'impiego negli animali** - Solo per uso esterno. Non lasciare che gli animali mastichino il collare. Non utilizzare altri medicinali ad azione antiparassitaria durante la permanenza del collare o entro 7 giorni dalla rimozione. Rimuovere le pulci da giovani gattini e dalle madri gatte con un attento uso di un pettine per pulci. Non usare in concomitanza con gli agenti neurolettici del gruppo fenotiazine. Non usare su animali affetti da insufficienza cardiaca, spasmi bronchiali, malattie epatiche o renali. Fissare il collare intorno al collo degli animali, regolando la lunghezza fino ad ottenere una posizione confortevole. Se applicato su un animale in crescita, adattare il collare alla crescita del collo dell'animale, ed eliminare immediatamente tutti i residui e/o i ritagli del collare. Nell'animale adulto, l'applicazione corretta consente di inserire due dita tra il collare e il collo. Tagliare e smaltire la lunghezza in eccesso. L'adattamento del collare (intorno al collo) deve essere regolarmente verificato. Durante i primi giorni di utilizzo si consiglia di controllare il collo dell'animale. È necessario un controllo continuativo dell'integrità del collare lungo tutto il periodo di permanenza e contatto con l'animale. Vedi sez. "Posologia". **Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali** - Non permettere ai bambini di giocare con il collare. Non permettere ai bambini di succhiare o masticare il collare poiché questo può essere pericoloso. Non consentire che animali che indossano il collare dormano nello stesso letto del proprietario, soprattutto se bambini. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato il collare. Il diazinone è un composto organofosforico: non toccare il collare se si è stati avvisati di non maneggiare sostanze anticolinesterasiche dal medico. In caso di malessere a seguito di manipolazione del collare, consultare il medico. Non rimuovere il collare dalla confezione fino al momento dell'uso. Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare gli alimenti, le bevande o i recipienti destinati a contenerle. Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. **Impiego durante la gravidanza, l'allattamento** - Non utilizzare su gatte in gravidanza od allattamento. **Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione** - Non utilizzare contemporaneamente e nei 7 giorni successivi alla rimozione altri antiparassitari (organofosforici o carbammati o neurolettici del gruppo di fenotiazine). **Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario** - Non superare le dosi consigliate. I sintomi di intossicazione sono: dispnea, salivazione, rigidità delle articolazioni. In caso di ingestione accidentale, può verificarsi sovradosaggio e possono comparire sintomi quali ipersalivazione, vomito e diarrea. Chiedi immediatamente consiglio al tuo veterinario. In caso di intossicazione grave, iniettare del solfato di atropina alla dose di 0,2 mg/kg. **Incompatibilità** - Nessuna nota. **PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE** - Conservare nella confezione originale a temperatura inferiore a 25°C. Dopo l'apertura usare immediatamente. **PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI** - Il medicinale veterinario non deve essere smaltito nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici, chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire il medicinale di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente. Estremamente pericoloso per i pesci e la vita acquatica. Non contaminare stagni, canali o fossati con il collare o imballaggi vuoti. - **A.I.C.** 104796014 - **DATA DELL'ULTIMA REVISIONE** - 02/2018

84029301